


MESA 4: ComunicaSEX: visión 360°

Mar Vera García

Centro Sanitario Sandoval. IdISSC.
Instituto de E. Infecciosas.
Hospital Clínico San Carlos. Madrid

Entrevista y comunicación de resultados en enfermedades relacionadas con el sexo.

Top 10 causes of healthy life lost in young adults aged 15-44 years old




30	DIFFERENT BACTERIA, VIRUSES AND PARASITES ARE KNOWN TO BE TRANSMITTED THROUGH SEXUAL CONTACT.
8	OF THESE ARE LINKED TO THE GREATEST INCIDENCE OF SEXUALLY TRANSMITTED DISEASE.
4	OF THESE 8 ARE CURRENTLY CURABLE: SYPHILIS, GONORRHOEA, CHLAMYDIA AND TRICHOMONIASIS.
4	ARE VIRAL INFECTIONS AND ARE INCURABLE: HEPATITIS B, HERPES SIMPLEX VIRUS (HSV OR HERPES), HIV, AND HUMAN PAPILLOMAVIRUS (HPV).

Rogstad K E, et al. 2011, ABC of sexually transmitted infections. - Sixth Edition ,Blackwell Publishing Ltd



Alta incidencia de las ITS en las últimas decadas




28, 29 y 30 de abril de 2022

XXXXI CONGRESO DE COMUNICACIÓN Y SALUD

EPIDEMIOLOGÍA





28, 29 y 30 de abril de 2022

XXXI CONGRESO
DE COMUNICACIÓN Y SALUD

ITS en el mundo, OMS 2020


Epidemiología de las ITS a nivel mundial: 374 millones

Una de cada 25 personas entre 15 y 49 años.







New cases of four curable STIs among adults (15–49 years old) per year, by sex, global, 2020



Global Progress Report on HIV, viral hepatitis and sexually transmitted infections, 2021, WHO- Data slides

Metas mundiales de la OMS para el control de las ITS: AGENDA 2030





• • • Syphilis new infections Progress in 2020 Target


INCIDENCE OF SYPHILIS AMONG 15-49 YEARS OLD:

2030 TARGET AND PROGRESS IN 2020

Proyecto de Estrategia Mundial del Sector de la Salud contra las ITS para 2016-2021. OMS.

ITS en EE.UU, 2019 Incremento ITS 2014-2019 Las ITS reportadas en EE.UU. alcanzan su máximo histórico por 6º año consecutivo


6th consecutive year of RECORD-BREAKING STD cases







For more information visit www.cdc.gov/nchhstp/newsroom









CDC´s anual report, Sexually Transmitted Disease Surveillance, 2019.www.cdc.gov/std/stats. CDC´s anual report, Sexually Transmitted Disease Surveillance, 2016. https://www.cdc.gov/std/stats08/surv2008-complete.pdf

ITS en Europa, ECDC 2019

Incremento de las ITS entre 2012-2018 reported by ECDC

Sexually transmitted infections: a long-standing and ongoing threat for public health

Every year, more than

500 000

sexually-transmitted infections (STIs) are notified in the EU/EEA and the UK

Every day, there are more than one million new cases of curable STIs among people aged 15-49 years globally, according to WHO estimates







European Centre for Disease Prevention and Control.Introduction to the Annual Epidemiological Report.In: ECDC. Annual epidemiological report for 2018 [Internet]. Stockholm: ECDC; 2020.

Incremento de las ITS entre 2013-2019


España













OMS: "Poblaciones CLAVE" para las ITS

- ➤ En general, se consideran "poblaciones CLAVE" para las ITS:
 - ■Trabajador@s del sexo y sus clientes
 - Hombres que tienen sexo con hombres (HSH)
 - Personas transgénero
 - Reclusos
 - Jóvenes y adolescentes
 - Consumidores de drogas

Estrategia mundial del sector de la salud contra las ITS 2016-2021. Hacia el fin de las ITS. WHO/RHR/16.09 © World Health Organization 2016

SEXUALLY TRANSMITTED INFECTIONS AMONG YOUNG AMERICANS

Young people account for a

substantial proportion of new STIs



Americans ages 15-24 make up just 27% of the sexually active population

But account for 50% of the 20M new STIs in the U.S. each year



Consequences are particularly severe for young women

Undiagnosed STIs cause 24,000 women to become infertile each year



Infections: 820,000 (all ages)



Chlamydia 2.9 million



14.1 million



Genital Herpes 776,000



HIV 47,500 *Ages 13-24



Syphilis 55,400

Many do not know they're infected because STIs often have no symptoms

Data are cases among youth ages 15-24


Gonorrhea

Chlamydia

200,000 570,000

1 million

1.8 million



infections

Estimated total new

CDC's anual report, Sexually Transmitted Disease Surveillance, 2017.www.cdc.gov/std/stats. CDC's anual report. Sexually Transmitted Disease Surveillance. 2016. https://www.cdc.gov/std/stats08/surv2008-complete.pdf

Toda la información epidemiológica disponible en los últimos años subraya la...

ENORME VULNERABILIDAD DEL COLECTIVO HSH FRENTE AL VIH/OTRAS ITS

En los últimos años, en los países desarrollados se detecta un aumento de la incidencia de ITS, especialmente en HSH.

-CDC. Sexually Transmitted Disease Surveillance treatment guidelines, 2021. MMWR, July 23, 2021

-Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica..Unidad de vigilancia del VIH y conductas de riesgo. Vigilancia epidemiológica de las infecciones de transmisión sexual en España, 2018. Madrid: Centro Nacional de Epidemiología-ISC-III/PNS-DGSP, Calidad e Innovación; 2020

CENTRO SANITARIO SANDOVAL

Hospital Clínico San Carlos. IdISSC. Comunidad de Madrid









Accesibilidad.

Atención multidisciplinar ITS. Investigación. Docencia. Interacción con Atención Primaria, Hospitalaria y ONGs



Principales microrganismos causantes de las ITS











PROTOZOOS






ECTOPARÁSITOS

- Neisseria gonorrhoeae
- Chlamydia trachomatis
- Treponema pallidum
- Mycoplasma Genitalium
- Haemophilus Ducreyi
- VIH y Hepatitis A,B, C, D y E
- Virus Herpes Simplex tipo I y II
- Virus del Papiloma Humano
- Virus del Molluscum Contagiosum
- Trichomonas vaginalis
- Giardia lamblia

- Pediculosis pubis
- Escabiosis o sarna






"A major public health problem worldwide"

- 1. Proporcionar el tratamiento adecuado y eficaz
- 2. Disminuir la aparición de complicaciones y/o secuelas
- 3. Permite identificar personas con conductas sexuales de riesgo.
- 4. Las ITS patología infecciosa con gran impacto social.
- 5. Las ITS incrementan riesgo de transmisión sexual del VIH.



Manejo clínico adecuado de las ITS



Anamnesis sexual: Importancia de la comunicación









Sólo existen dos cosas importantes en la vida. La primera es el sexo y la segunda no me acuerdo.


(Woody Allen)





CLAVES ANAMNESIS SEXUAL

- ✓ Empatía, clima de confidencialidad: central en la relación médico-paciente
- ✓ Evitar suposiciones sobre las prácticas del paciente.
- √ Preguntas abiertas y concisas
- √ Facilitar acceso a la consulta
- √ Consulta rápida y resolutiva



- √ No encasillar
- √ No son colectivos de riesgo, son vulnerables
- ✓ Identificar factores asociados a prácticas de riesgo para las ITS (alcohol, drogas).









Las prácticas sexuales poseen distinta efectividad para la transmisión sexual de los diferentes patógenos







SEXUAL HEALTH **8** "**b**"s

2

The five "P"s stand for:

- Partners
- Practices
- Protection from STDs
- Past history of STDs
- Prevention of pregnancy

These are the areas that you should openly discuss with your patients.

You probably will need to ask additional questions that are appropriate to each patient's special situation or circumstances.

ANAMNESIS SEXUAL ¿¿Qué preguntar?? Regla de las 5 "P"

Parejas sexuales PS

Prácticas sexuales con PS

Uso del Preservativo con PS


Antecedentes de alguna ITS Previa


Prevención del embarazo no deseado

Exploración física


- ☑ Genitales
- ☑ Región perianal
- ☑ Inspección general de la piel
- ☑ Cavidad oral y orofaringe









Prevención combinada frente al VIH/otras ITS














Intervención Conductual

Educación sanitaria: Promoción uso del preservativo



- Hágase la prueba al menos una vez o más veces si está en riesgo.
- Use condones de la manera correcta cada vez que tenga relaciones sexuales anales o vaginales.
- Si está en muy alto riesgo de contraer el VIH, pregúntele a su proveedor de atención médica si la profilaxis prexposición (PrEP) es lo adecuado para usted.
- Si cree que se ha expuesto al VIH dentro de los últimos 3 días, pregúntele de inmediato a



Póntek



generales y específicas

(HSH, Jóvenes, CAD,

Instituciones penitenciarias...):

promover el uso del preservativo.

tóxicos



00

Sólo existen dos cosas importantes en la vida. La primera es el sexo y la segunda no me acuerdo.

(Woody Allen)





Consejo Preventivo Individualizado: Importancia de la comunicación

- Medida conductual importante para la prevención del VIH/otras ITS
- Informar sobre las vías de transmisión del VIH/otras ITS



Explicar la prevención combinada



- Insistir en el uso del preservativo.
- Informar sobre los riesgos de algunas APPs para la búsqueda de contactos sexuales
- Manejo de personas con consumo "problemático" de sustancias: Chemsex:
 - Atención psicológica y/o psiquiátrica y programas de reducción de riesgos y daños



Chemsex




El chemsex se define como el uso de drogas para el sexo.

- Entre los HSH se ha producido un rápido incremento del consumo de nuevas drogas psicotrópicas, con potente efecto desinhibidor, estimulantes de la actividad sexual y algunas de ellas con alto poder adictivo:
 - Mefedrona, Metanfetamina y GHB/GBL ("G") son las drogas más utilizadas junto con otras sustancias: Éxtasis (MDMA), Poppers y Potenciadores de la erección, en un patrón de policonsumo.
 - A veces se usan inyectadas ("slam" o "slamming").
- > El chemsex se ha asociado con problemas de salud mental y con el incremento de la incidencia de ITS/VHC en el colectivo de HSH.

Mayor difusión por el uso de internet para la búsqueda de contactos sexuales.







CHEMSEX

"Cuando puedes parar, no quieres; cuando quieres parar, no puedes"

Cortesía Dr. Jesús Troya



¿Por qué Chemsex? The Chemsex study


- Aumentar la autoestima
- > Controlar el miedo al rechazo
- Incrementar la duración del sexo
- > Incrementar la libido y el deseo sexual
- > Potenciar sensaciones/placer del sexo
- > Facilidad de contacto en redes social (Grindr, Scruff...)
- > Facilidad de acceso a drogas
- Incidencia en rápido aumento en HSH

Adam Bourne et al. The Chemsex Study. Sigma research. London School of Hygiene & Tropical Medicine. 2014. ISBN: 978-1-906673-18-5

Cortesía Dr. Troya



APPs para la búsqueda de contactos sexuales El uso de redes sociales/aplicaciones móviles aumenta la incidencia de las ITS














Respuesta al fenómeno Chemsex



Para elaborar programas o intervenciones preventivas eficaces,

es necesario conocer la cambiante realidad epidemiológica y atención multidisciplinar.

Papel de los profesionales de AP frente a las ITS





<u>Consejo preventivo personalizado:</u> Vacunaciones (VHB, VPH, VHA). Revisiones programadas y a demanda.

<u>Diagnóstico</u>: Identificación de Indicadores clínicos para las ITS/VIH. Exploración clínica. Hallazgos analíticos. Diagnóstico clínico (sospecha clínica y epidemiológica). Diagnóstico microbiológico. Despistaje de otras posibles ITS concomitantes.

<u>Tratamiento ITS</u>: Administración inmediata del tratamiento de ITS. ¿Tratamiento empírico?. Control post tratamiento. Captación de contactos.




Estudio de contactos: Bajo sospecha epidemiológica

- ✓ Diagnosticar y tratar a personas infectadas (muchas asintomáticas)
- ✓ Romper la cadena de transmisión de la infección a nivel poblacional.

✓ Evitar la reinfección del caso índice.







Intervención Biomédica

Realización del test del VIH/Cribado otras ITS

Sospecha Clínica

Sintomatología
Hallazgos genitales y extragenitales
Antecedentes de ITS


Sospecha Epidemiológica/Conductual


Historia Clínica Completa Estudio de Contactos






PRUEBAS DIAGNOSTICAS VIH/OTRAS ITS





Nuevos diagnósticos del VIH que presentaron coinfección con otras ITS y localización extragenital (2007-2012)






Localización de la infección por Chlamydia trachomatis

Centro Sanitario Sandoval 2018

N= 1.206 casos de clamidiasis

Clamidiasis extragenitales: 454/1.206= 62,35 %



Vacunas recomendadas

Vacuna de hepatitis B (0,1,6m): Personas en riesgo que no estén vacunadas.

Vacuna de hepatitis A (0,6m):

- Viajeros a zonas endémicas.
- o Práctica de sexo oro-ana: HSH, trabajadores del sexo...
- o UDI
- Hepatopatía crónica de cualquier etiología
- Personas con la infección por el VIH


Vacuna del VPH:

○España, niñas < 12 años: Gardasil.

oLa vacuna nonavalente, previene la mayoría cánceres provocados por los 7 tipos de VPH más prevalentes y condilomas ano-genitales.

oFDA: Vacuna nonavalente a hombres y mujeres hasta los 45 años





Evidencia científica: la circuncisión masculina reduce riesgo del VIH y otras ITS en un 60%

XXXI CONGRESO De comunicación y salud Tres ensayos
controlados
aleatorios: la
circuncisión
segura: por
profesionales
sanitarios bien
entrenados y en
entornos
equipados: segura.

Las recomendaciones
de la OMS / ONUSIDA
enfatizan que la
circuncisión
masculina debe
considerarse una
intervención eficaz
para la prevención del
VIH y otras ITS.


"The ambitious target of 20.8 million males circumcised by 2016" Servicios de prueba y asesoramiento del VIH

Tratamiento para las

Promoción prácticas sexuales seguras

Provisión de condones masculinos y femeninos

Asesorar uso correcto y consistente preservativo



TAR como Prevención: TasP

UNDETECTABLE = UNTRANSMITTABLE

PUBLIC HEALTH AND HIV VIRAL LOAD SUPPRESSION



Profilaxis Post-Exposición




Probabilidad estimada por acto de adquirir el VIH, de una fuente infectada, según la ruta de exposición


Tipo de Exposición	Riesgo por 10.000 exposiciones a una fuente infectada (IC 95%)				
Parenteral					
 Recibir transfusión sanguínea Compartir agujas entre los UDI Pinchazo percutáneo con aguja 	9.250 (8900-9610) 63 (41-92) 23 (0-46)				
Sexual					
■ Coito Receptivo anal	138 (102-186)				
 Coito insertivo anal Coito receptivo pene-vagina Coito insertivo pene-vagina Oral receptivo Oral insertivo 	11 (4-28) 8 (6-11) 4 (1-14) Bajo (pero no cero) (0-4) Bajo (pero no cero) (0-4)				
Vertical					
■ Madre a niño (sin TAR)	2.260 (1700-2900)				

Profilaxis Pre-Exposición





- > Herramienta preventiva adicional.
- Fármacos Antirretrovirales: Tenofovir (TDF) + Emtricitabina (FTC): 1 comp al día.
- > Personas seronegativas con prácticas sexuales de alto riesgo.
- > Objetivo: reducir la probabilidad de contraer la infección por el VIH.



Who Health Organization. WHO Expands recommendation on oral pre-exposure prophylaxis of HIV infection (PrEP). November 2015.

Kaiser Permanente Northern California
San Francisco

Redefining Human Immunodeficiency Virus (HIV) Preexposure Prophylaxis Failures

Julia L Marcus ™, Leo B Hurley, Dong Phuong Nguyen, Michael J Silverberg, Jonathan E Volk

Clinical Infectious Diseases, Volume 65, Issue 10, 30 October 2017, Pages 1768–1769, https://doi.org/10.1093/cid/cix593

Published: 29 July 2017

Julio 2012 - Febrero 2017

4.991 en PrEP (mayoría HSH)



Aprobación y eficacia de la PrEP: FDA y CDC

- Ha combinación a dosis fija de tenofovir disoproxil fumarato (TDF) y emtricitabina (FTC) fue aprobada por la FDA en 2012 para su uso como PrEP en hombres y mujeres mayores de 17 años (1).
- Se confirma que el uso correcto de la PrEP reduce un 99% la probabilidad de contraer el VIH por relaciones sexuales, y un 74% por el uso de drogas inyectadas (2).
- ☐ En 2018, la FDA amplió la indicación de la PrEP a los <u>adolescentes</u> > 35 kg, que estén en riesgo de contraer el VIH (3).
- En 2019, la FDA aprobó la combinación de tenofovir alafenamida TAF/FTC como PrEP para varones adolescentes y adultos.(4,5).
 - **En 2021** los CDC, **actualizaron** las guías clínicas de manejo de la PrEP, incluyendo el uso de **cabotegravir IM para la PrEP** (6)
- 1. Cyp. Preexposure prophylaxis for the prevention of HIV infection in the United States—2017 update: a clinical practice guideline. Atlanta, GA: US Department of Health and Human Services, CDC; 2018. https://www.cdc.gov/hiv/pdf/risk/prep/cdc-hiv-prepartment
- 2. Jerness SM, Goodreau SM, Rosenberg E, et al. Impact of the Centers for Disease Control's HIV preexposure prophylaxis guidelines for men who have sex with men in the Uniquided States. J Infect Dis 2016;214:1800—7. https://doi.org/10.1093/infdis/jiw223
 3. Gilead Sciences Inc. U.S. Food and Drug Administration approves expanded indication for Truvada (emtricitabine and tenofovir disoproxil fumarate) for reducing the risk of acquiring HIV-1 in adolescents [Press-roser City, CA:
 Inc.; 2018. https:// www.gilead.com/news-and-press/press-room/press-releases/Soft-and-drug-administration-approves-expanded-indication-for-truvada-emtricitabine-and-tenofovir-disoproxil-fumarate-for-reducingthe-risk-of-HIV.
- 4. Descovy (emtricitabine and tenofovir alafenamide) [Package insert]. Foster City, CA: Gilead Sciences Inc.; 2019. https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2019/208215s011lbl.pdf
- 5. CDC, HIV surveillance report, 2018 (preliminary); vol. 30, Atlanta, GA; US Department of Health and Human Services, CDC; 2019, https://www.cdc.gov/hiv/library/reports/hiv-surveillance.html.
- 6. CDC. Preexposure Prophylaxis for the Prevention of HIV Infection in the United States 2021 Update Clinical Practice Guideline



Gran eficacia preventiva de la PrEP sobre la transmisión del VIH



En base a los resultados de los EC y de estudios observacionales, la eficacia preventiva de la PrEP para la transmisión sexual, se estima en torno al 99%, cuando existe una muy alta adherencia.

Sexual	~ 99%	Los niveles muy altos de adherencia a la PrEP garantizan la máxima eficacia.
Uso de drogas inyectables	74% - 84%	Estas estimaciones se basan solo en tenofovir y no necesariamente cuando se toma a diario. La eficacia puede ser mayor para la terapia oral de dos fármacos y si se usa a diario.

Jezis SM, Goodreau SM, Rosenberg E, et al. Impact of the Centers for Disease Control's HIV preexposure prophylaxis guidelines for men who have sex with men in the United States. J Lezis Dis 2016;214:1800–7. https://doi.org/10.1093/infdis/jiw223

Precosure Prophylaxis for the Prevention of HIV Infection US Preventive Services Task Force Recommendation Statement US Preventive Services Task Force P



Reducción del uso del preservativo tras el inicio de la PrEP (N=110)

Table 2. Behavioral changes concerning condom use and number of sexual partners before and after PrEP.

	Enrollment without PrEP % (N)	After two years on PrEP % (N)
Use of condom in anal intercou	irse	
• Usually (>50%)	85.4 (94)	30.0 (34)
• Occasionally (<50%)	10.0 (11)	50.0 (55)
• Never (0%)	4.5 (5)	20.0 (22)
Number of sexual partners per	month	
• 1–5	32.7 (36)	31.8 (35)
• 6-10	47.3 (52)	40.0 (44)
• 11–50	15.65 (17)	24.5 (27)
•>50	4.5 (5)	3.6 (4)


https://doi.org/10.1371/journal.pone.0245925.t002

Low use of condom and high STI incidence among men who have sex with men in PrEP programs

XXXI CONGRESO
DE COMUNICACIÓN Y SALUD

Ayerdi O, et al. PLOS ONE, Febr. 2021





Perfil: > 5 ITS:

- Menor de 30 años
- > >10 parejas sexuales /mes
- Usuario de drogas para el sexo (chemsex)

rcidencia de ITS pasó de 69,5 por 100 personas-años antes del inicio de PrEP a 98,4 por 100 personas-años en el seguimiento.


Tracefer MW, et al; PrEPX Study Team. Association of HIV Preexposure Prophylaxis With Incidence of Sexually Transmitted Infections Among Individuals at High Risk of HIV Infection. JAMA. 2019 Apr 9;321(14):1380-1390. doi: 10.1001/jama.2019.2947..

28, 29 y 30 de abril de 2022

28, 29 y 30 de abril de 2022


Drogas consumidas y sexo sin condón en 110 usuarios de PrEP

Uso de drogas para el sexo/chemsex: 94,5%




Las drogas más asociadas al sexo desprotegido, fueron: Metanfetamina, Mefedrona y GHB

Ayerdi O et al. PLoS ONE 2021 https://doi.org/10.1371/journal.pone.0245925



Chemsex y sexo anal sin ptvo. en 253 HSH con SCVr al VIH

Centro Sanitario Sandoval, 2014-2019



Las sustancias que más se asociaron con tener sexo anal sin preservativo en SCVr fueron:

Mefedrona (100%), GHB (95%), Metanfetamina (94%)

Practicaban chemsex: 88%

- El 74% (187/253) tenían sexo anal sin condón bajo el efecto de las drogas.
- A lo largo del estudio la práctica del chemsex ha ido en aumento.
- Las drogas más asociadas al <u>sexo anal no protegido</u> fueron: Mefedrona (100%), Metanfetamina (94%), Ketamina (93%), Poppers (89%) y GHB (80 %).
- Participación en **sesiones** de chemsex: 29%%.

Practicaban Slamming: 2%

Uso de Apps/Redes sociales: 93%

- Las más frecuentes: Grindr: 83%, Scruff: 30%; Wapo: 23%.
- El 70,4% atribuyó la transmisión del VIH al sexo desprotegido con un contacto conocido a través de una App.





Ayerdi Aguirrebengoa Oskar, Vera Garcia Mar, Puerta López Teresa et al. Changes in the profile of newly HIV-diagnosed men who have sex with men, Madrid, 2014 to 2019. Euro Surveill. 2021;26(47):pii=2001501.1

¿Qué nos depara el futuro en prevención...?





Intervención Conductual

Nuevas tecnologías para búsqueda de contactos sexuales



Intervención Biomédica

¿Vacuna del gonococo? ¿Vacuna del VIH?




Intervención Farmacológica

Pauta profiláctica diaria con Doxiciclina Microbicidas anti-VIH vaginales & rectales

Zou H, Fan S. Characteristics of Men Who Have Sex With Men Who Use Smartphone Geosocial Networking Applications and Implications for HIV Interventions: A Systematic Review and Meta-Analysis. Arch Sex Behav. 2017 May;46(4):885-

Abordaje de las ITS: Atención multidisciplinar



CONCLUSIONES I

- ❖ En los últimos 10 años se observa en España, y en otros países desarrollados, un persistente incremento de la incidencia de ITS, especialmente en HSH.
- Las ITS de localización extragenital suelen cursar de forma asintomática.
- Conviene pedir exudados y serologías para el diagnóstico de las ITS en función de las prácticas sexuales de cada individuo.
- Las diferentes prácticas sexuales poseen distinta efectividad para la transmisión de los microorganismos causantes de las ITS.
- La anamnesis (indicadores conductuales) a través de la **comunicación** con el paciente y los hallazgos clínicos son imprescindibles para identificar los riesgos de cada individuo, dirigir las pruebas diagnósticas, realizar el tratamiento especifico de las ITS y establecer un consejo preventivo personalizado.



CONCLUSIONES II

Se necesita investigación en nuevos fármacos y vacunas frente a las diferentes ITS.

28, 29 y 30 de ab de 2022 La gran eficacia preventiva de la PrEP, la creciente difusión del consumo de drogas para el sexo y del uso de redes sociales para la búsqueda de contactos sexuales, ha incrementado la incidencia de ITS, especialmente en HSH.

XXI CONGRESO COMUNICACIÓN Y SALI Identificar y monitorizar los factores asociados al incremento de las ITS, permite diseñar intervenciones preventivas ajustadas a la cambiante situación epidemiológica, que con frecuencia requieren una atención multidisciplinar.



Muchas gracias

